

Redes Complexas

Aula 5

Aula passada

- Centralidade
- Grau, betweeness, closeness
- Autovetor, Katz, PageRank, PPR

Aula de hoje

- Padrões de mixagem (*mixing patterns*)
- Correlação entre graus
- Similaridade entre vértices

Padrões de Mixagem


- Vértices possuem tipos diferentes
 - propriedade do vértice, não estrutural
- Redes sociais: gênero, idade, nacionalidade, time
- Outros: composição química, velocidade, idioma, função, etc

Como vértices se *misturam*?

- Quais são as características na pontas das arestas?
- **Problema:** definir uma métrica para capturar este fenômeno

Exemplo

- Tese de mestrado (2014 na UFMG)
 - estudo sobre Google+ por Gabriel Silva
 - Pessoas e amizades (direcionada), pessoas em países
 - peso é fração de arestas saindo do tipo (>0.01)



- ## ■ Quem são os *hubs*? Quais outras características?

Exemplo

- Rede social, casamento entre grupos étnicos diferentes

| | | women | | | |
|-----|----------|-------|----------|-------|-------|
| | | black | hispanic | white | other |
| men | black | 0.258 | 0.016 | 0.035 | 0.013 |
| | hispanic | 0.012 | 0.157 | 0.058 | 0.019 |
| | white | 0.013 | 0.023 | 0.306 | 0.035 |
| | other | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.016 |

TABLE I: The mixing matrix e_{ij} and the values of a_i and b_i for sexual partnerships in the study of Catania *et al.* [23]. After Morris [24].

- Tendência de relacionamento entre vértices do mesmo tipo
- Como representar (medir) fenômeno?

Coeficiente de Assortatividade

- Assortative coefficient
- e_{ij} : fração de arestas entre vértices do tipo i e j
 - $e_{ij} = n_{ij} / m$ ← m é o número total de arestas da rede
- $$\sum_{ij} e_{ij} = 1, \quad \sum_j e_{ij} = a_i, \quad \sum_i e_{ij} = b_j,$$
- a_i : fração de arestas que incidem sobre tipo i
- b_j : fração de arestas que incidem sobre tipo j
- Na maioria dos casos $a_i = b_j$, para $i = j$
- Mas não quando grafo é bipartido (caso anterior)

Coeficiente de Assortatividade

■ Assortative coefficient

$$r = \frac{\sum_i e_{ii} - \sum_i a_i b_i}{1 - \sum_i a_i b_i}$$

Fator de normalização

$a_i b_i$ é o valor esperado
de e_{ii} se fosse aleatório

- $r = 0$, relacionamentos totalmente aleatórios
- $r = 1$: relacionamentos somente entre iguais
- $r < 0$: relacionamento entre diferentes

Exemplo

- Rede social, casamento entre grupos étnicos diferentes

| | | women | | | | a_i |
|-----|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | | black | hispanic | white | other | |
| men | black | 0.258 | 0.016 | 0.035 | 0.013 | 0.323 |
| | hispanic | 0.012 | 0.157 | 0.058 | 0.019 | 0.247 |
| | white | 0.013 | 0.023 | 0.306 | 0.035 | 0.377 |
| | other | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.016 | 0.053 |
| | | b_i | 0.289 | 0.204 | 0.423 | 0.084 |

TABLE I: The mixing matrix e_{ij} and the values of a_i and b_i for sexual partnerships in the study of Catania *et al.* [23]. After Morris [24].

- $r = 0.621$

Mixagem em Função da Estrutura

- Exemplo anterior: vértices tinham tipo
- Definir mixagem em função da estrutura

Idéias?


- Característica topológica de vizinhos que possa ser quantificada
- Ex. grau do vértice como “tipo”
 - correlação entre graus de vértices

Correlação entre Grau

- Métrica para medir correlação entre graus de vértices vizinhos
- Correlação positiva: graus altos são vizinhos
- Correlação negativa: grau alto é vizinho de grau baixo
- Métrica: Coeficiente de correlação de Pearson
 - Medida estatística de correlação empírica
 - Aplicada ao grau de vértices vizinhos

Correlação entre Grau

- p_k : fração de vértices com grau k
- q_k : fração de vértices com *restante de grau* igual a k



$$q_k = \frac{(k+1)p_{k+1}}{z},$$

grau médio do grafo

- Relação entre q_k e notação anterior:

$$\sum_j e_{jk} = q_k.$$

fração de arestas entre vértices de grau j e k

Correlação de Pearson

- Aplicada a grau de vértices vizinhos

$$r = \frac{\sum_{jk} jk(e_{jk} - q_j q_k)}{\sigma_q^2},$$

valor esperado de e_{jk} se fosse aleatório

Variância (empírica) de q_k



- $r = -1$, perfeitamente dissociados
- $r = 1$: perfeitamente associados
- $r = 0$: associação aleatória

Medida de Similaridade

- Como definir uma medida de similaridade entre os vértices?
- **Ideia:** número de vizinhos em comum
 - n_{ij} : número de vizinhos em comum entre vértices i e j
- Normalização?
 - dividir por n penaliza vértices de grau baixo
- **Jaccard Similarity**
 - medida de similaridade entre dois conjuntos (os vizinhos dos vértices)
 - $J(A,B) = |\text{interseção}(A,B)| / |\text{união}(A,B)|$

Coeficiente Adamic/Adar

- Jaccard não penaliza vértices de grau grande
 - grau grande está em muitas interseções
- **Ideia:** dar mais peso para interseção com vértices de grau menor



- Adamic/Adar: soma ponderada inversamente pelo grau dos vizinhos em comum

$$A(x, y) = \sum_{u \in N(x) \cap N(y)} \frac{1}{\log |N(u)|}$$

← Grau do vértice u,
na interseção de x e y

← mais de 2300 citações!

Similaridade de Coseno

- Usar ideia de espaço vetorial
- Vértice é um vetor no espaço vetorial de n dimensões (uma dimensão por vértice)
 - vizinhos possuem valores 1 no vetor
- Usar geometria
 - coseno do ângulo entre vetores (dois vértices)
 - $\cos(\theta) = x \cdot y / |x| |y|$
- Fazendo as contas...
 - $x \cdot y = \text{número de vizinhos em comum}$
 - $|x| |y| = \text{média geométrica do no. de vizinhos}$
 - $S_{ij} = n_{ij} / \sqrt{d_i} \sqrt{d_j}$

Similaridade Entre Vizinhos

- **Fato:** vértices vizinhos em redes reais possuem muitas similaridades
 - ex. maior chance de ter vizinho em comum

Como medir similaridade?

- Utilizando apenas a estrutura

Muitas maneiras!

- **Ideia:** Comparar com aleatório para ter referência